



دوگان (ثانویه) مسایل برنامه ریزی خطی

۴

۴-۱- تعاریف و مفاهیم

در ارتباط با هر مسئله برنامه ریزی خطی اولیه (*primal*) معادل آن به نام مسئله مزدوج (دوگان - همتا - همزاد، *Dual* یا ثانویه) وجود دارد به طوری که این مسئله از ترانهاده کردن کل ماتریس ضرایب با تغییرات جزئی دیگر حاصل می شود.

۴-۱-۱- خواص مسئله ثانویه

- ۱- اعداد سمت راست می توانند منفی باشند.
- ۲- جواب اولیه و ثانویه بطور همزمان در جدول نهایی وجود دارد.
- ۳- در این روش بجای استفاده از متغیر مصنوعی می توان از محدودیت مصنوعی استفاده نمود.

۴-۱-۲- دلایل استفاده از مسئله ثانویه

- ۱- کمتر شدن مقدار محاسبات (تعداد مراحل عملیات بستگی به تعداد محدودیتها دارد نه تعداد متغیرها)
- ۲- جلوگیری از به کار بردن متغیرهای مصنوعی
- ۳- تعبیر اقتصادی مسئله ثانویه در مسئله اولیه b_i نشان دهنده مقدار منابع در دسترس، و متغیرهای

مزدوج (i ها) نشان دهنده ارزش منبع i ام و سهم قابل وصول فعالیتها از منابع i ام می باشد.

۴- تجزیه و تحلیل حساسیت

۵- نقطه مبدأ مختصات، جزء ناحیه جواب نباشد.

۴-۲- روابط متقابل مسئله اولیه و ثانویه

یک مسئله ثانویه را به راحتی می توان با اطلاعات مسئله اولیه نمایش داد.

مسئله ثانویه (اولیه)		مسئله اولیه (ثانویه)	
تابع هدف	Min	Max	تابع هدف
ضریب تابع	مقادیر ضرایب تابع هدف	مقادیر ضرایب تابع هدف	ضریب تابع
سمت راست	سمت راست	سمت راست	سمت راست
محدودیت	تعداد محدودیت (n)	تعداد محدودیت (m)	محدودیت
متغیر	\geq	\leq	متغیر
	\leq	\geq	
	آزاد در علامت	$=$	
محدودیت	تعداد متغیرها (n)	تعداد محدودیتها (m)	متغیر
	\geq	\geq	
	\leq	\leq	
	$=$	آزاد در علامت	
ضرایب محدودیتها	ماتریس ضرایب	ترانسپوز ماتریس ضرایب	ضرایب محدودیتها
متغیرهای پایه	m متغیر اساسی	n متغیر اساسی	متغیرهای پایه
	n متغیر غیر اساسی	m متغیر غیر اساسی	

بنابراین مسائل اولیه و ثانویه به صورت مدل های زیر نمایش داده می شوند:

مسئله اولیه	مسئله ثانویه
$Max Z = \sum_{j=1}^n C_j x_j$	$min Y = \sum_{i=1}^m b_i y_i$
$st : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ x_j \geq 0 \quad i = 1, \dots, m \end{cases}$	$st : \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ji} y_i \geq C_j \\ y_i \geq 0 \quad j = 1, \dots, n \end{cases}$

تذکره: علامت متغیرها از روی محدودیتها و علامت محدودیتها از روی متغیرها تعیین می شود.

نکته: مزدوج مزدوج هر برنامه ریزی خطی خود آن مسئله می باشد.

تذکره: تعداد محدودیتهای مسئله اولیه برابر تعداد متغیرهای مسئله ثانویه و برعکس می باشد.

نکته: مقادیر متغیرهای پایه در هر مرحله از جدول مسئله اولیه در تمام محدودیتها صدق می کند، ولی در مسئله ثانویه این چنین نبوده و فقط در جدول نهایی به این حالت می رسیم. در سایر موارد متغیرها در محدودیتها صدق نمی کند. به عبارت دیگر ثانویه اولین جواب قابل قبولی که حاصل می شود جواب بهینه است.

نکته: در طی مراحل سیمپلکس مسئله اولیه مقدار تابع هدف با تابع هدف هم جهت است ولی در مسئله ثانویه در خلاف جهت تابع هدف حرکت می کنیم. (در واقع در حالت Max تابع هدف از مقدار کم شروع نموده و به بهینه می رسد ولی در حالت Min تابع هدف از مقدار زیاد شروع و به حالت بهینه می رسد).

نکته: در سیمپلکس مسئله اولیه عنصر لولا همواره مثبت می باشد ولی در سیمپلکس مسئله ثانویه عنصر لولا منفی است.

نکته: در سیمپلکس مسئله اولیه ابتدا متغیر ورودی و سپس خروجی تعیین می شود، در صورتی که در سیمپلکس ثانویه دقیقاً برعکس این عمل اتفاق می افتد.

نکته: در مسئله اولیه زمانی که مسئله، جواب اولیه قابل قبول ندارد از متغیر مصنوعی استفاده می شود، در صورتی که در مسئله ثانویه زمانی که مسئله جواب ثانویه قابل قبول ندارد از محدودیت مصنوعی استفاده می شود تا به جواب قابل قبول مطلوب دست یابیم.

نکته: بکارگیری متغیرهای مصنوعی در مسئله اولیه معادل بکارگیری محدودیت مصنوعی در

مسئله ثانویه است.

نکته: تعداد گوشه‌های هر دو مسئله با هم برابر است (زیرا m و n فقط جایشان عوض شده است)

$$\frac{(m+n)!}{m!n!}$$

یعنی

نکته: هر جواب اساسی (گوشه) بهینه در مسئله اولیه متناظر با یک جواب اساسی (گوشه) بهینه در مسئله ثانویه است و مشخصه آن داشتن مقادیر تابع هدف برابر است.

نکته: هر دو گوشه متناظر نمی‌توانند در دو مسئله اولیه و ثانویه موجه باشند مگر اینکه آن جواب اساسی یا گوشه بهینه باشد.

نکته: مقدار تابع هدف بهینه در هر دو مسئله اولیه و ثانویه برابر می‌باشد.

نکته: باتوجه به جداول سیمپلکس اولیه، برای مسئله ثانویه مقدار متغیرهای اصلی، در سطر صفر در زیر متغیرهای کمکی جدول سیمپلکس اولیه، و مقدار متغیرهای کمکی، در سطر صفر در زیر متغیرهای اصلی جدول سیمپلکس اولیه قرار دارد.

۳-۴- قضایای مسئله دوگان

قضیه ۱: ثانویه مسئله ثانویه، مسئله اولیه می‌باشد.

قضیه ۲ (قضیه ضعیف دوگان): اگر x^* جواب قابل قبول برای مسئله اولیه با تابع هدف Max و y^* جواب قابل قبول برای مسئله ثانویه با تابع هدف Min باشد، رابطه زیر همواره برقرار است:

$$\left\{ \begin{array}{l} Cx^* \leq by^* \\ x^* \leq y^* \end{array} \right\} \Rightarrow (Max) \leq (Min)$$

حال اگر مسئله اولیه Min و مسئله ثانویه Max باشد علامتها عوض خواهد شد.

نتایج قضیه ضعیف دوگان

۱- مقدار تابع هدف مسئله Min به ازای هر جواب قابل قبول این مسئله، حد بالایی برای بیشترین مقدار تابع هدف مسئله بیشینه سازی می‌باشد.

۲- مقدار تابع هدف مسئله Max به ازای هر جواب قابل قبول این مسئله، حد پایینی برای کمترین مقدار تابع هدف مسئله کمینه سازی می‌باشد.

- ۳- اگر مسئله اولیه (Max) جواب قابل قبول داشته باشد و به ازای این جواب مقدار تابع هدف نامحدود باشد ($Z \rightarrow \infty$) در این صورت مسئله ثانویه نمی تواند جواب قابل قبولی داشته باشد.
 - ۴- اگر مسئله ثانویه (Min) دارای جواب قابل قبول باشد و به ازای این جواب، مقدار تابع هدف نامحدود باشد ($Y \rightarrow \infty$) در این صورت مسئله اولیه نمی تواند جواب قابل قبول داشته باشد.
 - ۵- اگر یکی از مسائل اولیه یا ثانویه جواب بهینه نامحدود داشته باشد در این صورت مسئله دیگر جواب قابل قبول نخواهد داشت.
 - ۶- اگر مسئله اولیه یا ثانویه جواب قابل قبول نداشته باشد، مسئله دیگر ممکن است جواب قابل نداشته باشد و یا اینکه مقدار تابع هدف نامحدود داشته باشد.
 - ۷- اگر مسئله اولیه جواب قابل قبول داشته باشد ولی ثانویه جواب قابل قبول نداشته باشد آنگاه مسئله اولیه نامحدود می باشد.
 - ۸- اگر مسئله ثانویه جواب قابل قبول داشته باشد ولی اولیه جواب قابل قبول نداشته باشد آنگاه مسئله ثانویه نامحدود می باشد.
- قضیه ۳ (قضیه معیار بهینگی): اگر x^* و y^* جوابهای قابل قبول مسئله اولیه و ثانویه باشند به گونه ای که مقادیر تابع هدف این دو مسئله به ازای این جوابها با یکدیگر مساوی باشند ($cx^* = by^*$) در این صورت x^* ، y^* جوابهای بهینه این دو مسئله می باشند.
- نتیجه قضیه معیار بهینگی: شرط لازم و کافی جهت بهینه بودن جواب مسئله اولیه و ثانویه اینست که این جوابها قابل قبول بوده و به ازای آنها مقادیر تابع هدف هر دو مسئله برابر گردد.
- قضیه ۴ (قضیه قوی دوگان): هرگاه x^* ، y^* جوابهای قابل قبول دو مسئله اولیه و ثانویه باشند آنگاه هر دو مسئله دارای جواب بهینه بوده و رابطه $cx^* = by^*$ برقرار است.
- نتیجه قضیه قوی دوگان: هرگاه هریک از مسائل اولیه یا ثانویه جواب بهینه داشته باشد، دیگری نیز جواب بهینه خواهد داشت.
- قضیه ۵ (قضیه اساسی دوگان): در مسائل برنامه ریزی خطی اولیه و ثانویه، یکی از سه حالت زیر بطور کلی رخ می دهد:
- ۱- هر دو مسئله جواب بهینه محدود دارند، به طوری که $cx^* = by^*$ برقرار است و در آن x^* ، y^*

متناظر آن در مسئله دیگر فعال است و اگر یک محدودیت در یک مسئله فعال نباشد آن وقت متغیر متناظر آن در مسئله دیگر باید صفر باشد. حال اگر $s_i = a^i x^* - b_i \geq 0$ و $s'_j = c_j - y^* a_j \geq 0$ به ترتیب متغیرهای کمکی مسئله اولیه و ثانویه باشد از معادله (I) داریم:

$$s'_j \times x_j^* = 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$y_i^* \times s_i^* = 0 \quad i = 1, \dots, m$$

نتایج حاصل از قضیه مکمل زاید

۱- در جواب بهینه مقدار $x^* = y^*$ می باشد.

۲- در صورتی که متغیر مسئله اولیه (x_j) مثبت باشد $(x_j$ در پایه باشد) آنگاه محدودیت متناظر در مسئله ثانویه بصورت مساوی (محدودیت فعال) برآورده می شود.

۳- در صورتی که محدودیت مسئله اولیه بصورت نامساوی مطلق برآورده شود $(s_i > 0)$ در پایه باشد) آنگاه متغیر متناظر در مسئله ثانویه صفر است $(y_i = 0)$

	s_i	
z	y_i	
s_i	۱	

۴- در صورتی که متغیر مسئله ثانویه (y_i) مثبت باشد $(y_i$ در پایه باشد) آنگاه محدودیت متناظر در مسئله اولیه بصورت مساوی $(s_i = 0)$ برآورده می شود.

۵- در صورتی که محدودیت مسئله ثانویه بصورت نامساوی مطلق برآورده شود $(s'_j > 0)$ در پایه آنگاه متغیر متناظر در مسئله اولیه صفر است $(x_j = 0)$.

۶- هر متغیر تصمیم در اولیه با یک متغیر کمکی در ثانویه ارتباط دارد و برعکس هر متغیر کمکی در اولیه با یک متغیر تصمیم در ثانویه در ارتباط می باشد. $s_i \cdot y_i = 0$, $x_j \cdot s'_j = 0$ که در آن x_j و y_i متغیرهای تصمیم اولیه و ثانویه s_i , s'_j متغیرهای کمکی به ترتیب اولیه و ثانویه می باشد.

۷- هر متغیر اساسی در اولیه با یک متغیر غیراساسی در ثانویه و برعکس هر متغیر غیراساسی در اولیه با یک متغیر اساسی در ثانویه در ارتباط است.

مثال: اگر حل بهینه مسئله‌ای بصورت زیر باشد جواب بهینه مسئله مزدوج آنرا بدون استفاده از جدول سیمپلکس بدست آورید.

$$\text{Max } Z = 0.75x_1 - 2.0x_2 + 0.5x_3 - 6x_4$$

$$0.25x_1 + 8x_2 + x_3 - 9x_4 \geq 0$$

$$-0.5x_1 + 12x_2 + 0.5x_3 - 3x_4 = 0$$

$$x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$x_1^* = x_2^* = 1$$

$$x_3^* = x_4^* = 0$$

ابتدا مزدوج مسئله فوق را بدست می آوریم:

$$\text{Min } Y = y_1$$

$$0.25y_1 - 0.5y_2 \geq 0.75$$

$$8y_1 + 12y_2 \geq -2.0$$

$$y_1 + 0.5y_2 + y_3 \geq 0.5$$

$$-9y_1 - 3y_2 \geq -6$$

$$y_1 \leq 0, y_2 \text{ آزاد در علامت}, y_3 \geq 0$$

$$\text{Max } Z = 0.75(1) - 2.0(0) + 0.5(1) - 6(0) = 1.25$$

در حالت بهینه داریم:

$$\text{Max } Z = \text{Min } Y = y_1 = 1.25 \Rightarrow y_1 = 1.25$$

حال محدودیت اول را برآورد می کنیم.

$$0.25x_1 + 8x_2 + x_3 - 9x_4 - s_1 = 0 \quad X = (1, 0, 1, 0)$$

$$0.25 + 1 - s_1 = 0 \Rightarrow s_1 = 1.25$$

بنابراین محدودیت اول بصورت نامساوی مطلق می باشد که در آن $s_1 = 1.25 > 0$ در پایه قرار دارد.

پس متغیر متناظر با آن در مسئله ثانویه صفر می باشد ($y_1 = 0$) یعنی:

$$(s_1 = 1.25) \Rightarrow y_1 = 0$$

$(S_7 = 0) \Rightarrow y_7 \neq 0$ محدودیت دوم بصورت مساوی

$(S_7 = 0) \Rightarrow y_7 \neq 0$ محدودیت سوم بصورت مساوی

از طرفی چون متغیرهای x_1 و x_2 در مسئله اولیه مخالف صفر می باشند پس محدودیت های متناظر در مسئله ثانویه محدودیت اول و سوم بصورت مساوی نوشته می شود. و داریم:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \neq 0 \Rightarrow 0/25y_1 - 0/5y_2 = 0/75 \\ x_2 \neq 0 \Rightarrow y_1 + 0/5y_2 + y_3 = 0/5 \end{array} \right\} \Rightarrow y_1 = 0, y_2 = -1/5, y_3 = 1/25$$

۴-۴ روابط متقابل جوابهای مسئله اولیه و ثانویه

در مسئله اولیه و ثانویه بطور خلاصه روابط زیر برقرار می باشد.

مسئله ثانویه	مسئله اولیه
جواب بهینه محدود	جواب بهینه محدود
جواب بهینه منحنی	جواب بهینه چندگانه
جواب بهینه چندگانه	جواب بهینه منحنی
بدون جواب مرجه	مقدار تابع هدف نامحدود ($Z = \infty$)
بدون جواب مرجه	بدون جواب مرجه
تابع هدف نامحدود ($Z = \infty$)	بدون جواب مرجه

۴-۵ روابط متقابل جداول مسئله اولیه و ثانویه

جداول نهایی و بهینه سیمپلکس یک مسئله اولیه و ثانویه دارای ارتباط متقابل مفهومی با یکدیگر می باشند.

۱- هر متغیر اصلی در اولیه به ترتیب، متناسب با یک متغیر کمکی در ثانویه است. و برعکس هر زلا متناسب با یک زد می باشد.

۲- اعداد سمت راست مسئله اولیه، مقدار ضرایب متغیرهای غیراساسی در سطر Y جدول سیمپلکس مسئله ثانویه است و برعکس.

۳- اعداد غیر صفر سطر Z در مسئله اولیه، مقدار متغیرهای اساسی در جدول ثانویه است و برعکس.

۴. مقدار متغیرهای تصمیم مسئله ثانویه در زیر سطر Y برابر قرینه و ترانسپوز (ترانهاده) مقدار متغیرهای غیراساسی در زیر سطر Z در مسئله اولیه است.

جدول نهایی مسئله ثانویه (Min)	جدول نهایی مسئله اولیه (Max)
A_N ثانویه	اولیه $-A_N^T$
C_N ثانویه	اولیه b_i
b_i ثانویه	مقدار C_N
مقدار Y	مقدار Z

جدول نهایی مسئله اولیه

	ثانویه	s'_1	s'_2	y_1	y_2	
متغیرهای تصمیم	z	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
z	۱	۰	۳۰	۰	۴۰	۲۰۰
s_1	۰	۰	-۴	۱	-۲	۲
x_1	۰	۱	$\frac{۳}{۲}$	۰	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۵}{۲}$

جدول نهایی مسئله ثانویه

	اولیه	s_1	s_2	x_1	x_2	
متغیرهای اساسی	z	y_1	y_2	s'_1	s'_2	RHS
Y	۱	۲	۰	$\frac{۵}{۲}$	۰	+۲۰۰
s'_2	۰	۴	۰	$-\frac{۳}{۲}$	۱	۳۰
y_2	۰	۲	۱	$-\frac{۱}{۲}$	۰	۴۰

یک مسئله به ۴ روش قابل حل می‌باشد:

- ۱- مسئله اولیه به روش سیمپلکس اولیه
- ۲- مسئله اولیه به روش سیمپلکس ثانویه
- ۳- مسئله ثانویه به روش سیمپلکس اولیه
- ۴- مسئله ثانویه به روش سیمپلکس ثانویه

حال نکات زیر در رابطه با روشهای فوق قابل ذکر می‌باشد.

نکته: تعداد مراحل حل یک مسئله اولیه برنامه‌ریزی خطی به روش سیمپلکس اولیه دقیقاً برابر تعداد مراحل حل ثانویه آن مسئله (دوگان) به روش سیمپلکس ثانویه می‌باشد. یعنی:

ثانویه به روش ثانویه \longleftrightarrow اولیه به روش اولیه

نکته: تعداد مراحل حل یک مسئله اولیه به روش سیمپلکس ثانویه دقیقاً برابر تعداد مراحل حل ثانویه آن مسئله (دوگان) به روش سیمپلکس اولیه می‌باشد. یعنی:

اولیه به روش ثانویه \longleftrightarrow ثانویه به روش اولیه

۴-۶ روابط متقابل ماتریس مسئله اولیه و ثانویه

اگر مسئله برنامه‌ریزی اولیه بصورت زیر بیان شود.

$$\text{Max } Z = Cx \quad (\text{مسئله اولیه})$$

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

در اینصورت مسئله ثانویه چنین بیان خواهد شد.

$$\text{Min } Y = b^T \cdot y \quad (\text{مسئله اولیه})$$

$$A^T y \geq C^T$$

$$y \geq 0$$

که در آن C^T ، A^T ، b^T ترانسپوز یا ترانواده b ، A و C می‌باشند بنابراین روابط زیر برقرار می‌باشد.

$$X_B^{-1} = \bar{b} = B^{-1} \cdot b$$

$$(۲) y = C_B \cdot B^{-1}$$

$$(۳) \begin{cases} \bar{a}_j = B^{-1} \cdot a_j \\ \bar{N} = B^{-1} \cdot N \end{cases}$$

$$(۴) \begin{cases} \bar{C}_j = C_B \cdot B^{-1} \cdot a_j - C_j = y \cdot a_j - C_j = C_B \cdot \bar{a}_j - C_j \\ \bar{C}_N = C_B \cdot B^{-1} \cdot N - C_N = y \cdot N - C_N = C_B \cdot \bar{N} - C_N \end{cases}$$

$$(۵) Z = C_B \cdot B^{-1} \cdot b = yb = C_B \cdot \bar{b}$$

نکته: $\frac{\partial X_{Bi}}{\partial x_j} = -y_{ij}$ که در آن x_j متغیر غیرپایه ای و x_{Bi} متغیر پایه ای خواهد بود.

۷-۴- تفسیر اقتصادی جداول سیمپلکس

یکی از مهم ترین ویژگی های مساله ثانویه، استفاده از مفاهیم اقتصادی حاصل از آن می باشد. از آنجائی که اعداد هر ستون مفاهیم مرتبط در مورد یک متغیر تصمیم را بیان می کند معمولاً تفسیر اقتصادی بصورت ستونی انجام می پذیرد.

در جداول سیمپلکس در صورتی که اعداد مثبت در سطری قرار گیرند که متغیر اساسی مربوط به آن سطر، متغیر کمکی باشد، به مفهوم میزان استفاده از آن منبع برای تولید یک واحد از محصولی (با افزایش یک واحد متغیر ورودی) است که در بالای ستون این عدد قرار گرفته است. در صورتی که متغیر اساسی مربوط به آن سطر متغیر تصمیم باشد به معنی کاهش آن متغیر اساسی است که در ازاء افزایش یک واحد از متغیر ورودی صورت می پذیرد و برعکس، اعداد منفی، افزایش منبع (در مورد متغیرهای کمکی) و یا افزایش تولید (در مورد متغیرهای تصمیم) است.

۷-۴-۱- تعریف شبه قیمت (قیمت سایه، قیمت مجازی، Dual Price)

شبه قیمت عبارتست از میزان تغییرات تابع هدف به ازای یک واحد افزایش در یکی از مقادیر سمت راست که برابر مقدار متغیر ثانویه متناظر آن محدودیت است (y_i). قیمت های سایه یا قیمت های ثانویه بیانگر ارزش اقتصادی هر واحد سمت راست می باشد. اگر اعداد سمت راست نشان دهنده میزان منابع موجود باشد، قیمت سایه منعکس کننده ارزش اقتصادی هر واحد از منبع می باشد.

نکته: در جدول سیمپلکس جوابهای اساسی در اولیه مقدار قیمت سایه برای ثانویه است و برعکس.

نکته: جدول سیمپلکس وقتی بهینه است که: هزینه نهایی = درآمد نهایی

نکته: از حاصلضرب قیمت‌های سایه (y_i) در مقدار منابع، مقدار Z^* حاصل می‌شود. و

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = y_i^*$$

۴-۷-۲. هزینه تقلیل یافته

عبارتست از میزان تغییرات تابع هدف به ازای یک واحد تولید از یکی از متغیرهای غیرپایه بهینه که برابر ضریب آن متغیر در سطر هدف جدول بهینه می‌باشد. یعنی به ازاء هر واحد باید ۳ واحد ضرر بدهیم.

	x_i	RHS
Z	۳	
	۱	
	۵	
	۷	

نکته: متغیرهای کمکی در حالت Min (ثانویه) به معنی میزان هزینه فرصت از دست رفته می‌باشد. در این شرایط بهترین حالت تساوی می‌باشد.

نکته: متغیرهای کمکی در حالت Max (اولیه) به معنی میزان منابع باقی مانده است.

نکته: y_i^* ها در جدول نهایی سیمپلکس اولیه در سطر Z و در زیر متغیرهای کمکی (متغیرهای اساسی جدول ابتدایی) قرار دارد.

نکته: اگر بخواهیم از منابعی افزایش تولید داشته باشیم، آنهایی را افزایش می‌دهیم که دارای قیمت سایه‌ای (y_i های متناظر) بیشتر باشد.

نکته: در مسائلی که با روش M بزرگ حل شده‌اند برای بدست آوردن قیمت‌های سایه‌ای (y_i)، در عناصر سطر صفر زیر متغیرهای شروع مسئله مقدار M را صفر قرار داده که در نتیجه قیمت سایه‌ای حاصل می‌شود.

۴-۸. روش حل سیمپلکس ثانویه

روش سیمپلکس ثانویه عموماً موقعی بکار می‌رود که همه ضرایب متغیرها در سطر تابع هدف

غیر منفی باشد (شرط بهین) ولی اعداد سمت راست مقادیر منفی داشته باشد (غیر موجه). جهت این کار گامهای زیر پیموده می شود:

- ۱- تابع هدف را بصورت Max تبدیل می کنیم (در صورت نیاز، ضرب عدد ۱- در طرفین)
- ۲- محدودیتها را به شکل \leq (ک.م) تبدیل می کنیم (در صورت نیاز با ضرب عدد ۱- در طرفین)
- ۳- با اضافه نمودن متغیرهای کمکی k_i به محدودیتها آنها را به شکل مساوی تبدیل می کنیم.
- ۴- مسئله را وارد جدول سیمپلکس می نمائیم.
- ۵- منفی ترین عدد سمت راست (b_i) را بعنوان متغیر خروجی انتخاب می کنیم. سطر مذکور سطر لولا نامیده می شود.

نکته: اگر تمام اعداد سمت راست دارای مقادیر غیر منفی باشد جواب اساسی فعلی موجه و بهینه می باشد.

نکته: اگر اعداد سمت راست (b_i) ، جهت ورود مساوی باشند به دلخواه یکی را انتخاب می کنیم. ۶- متغیر ورودی با تقسیم اعداد سطر صفر بر اعداد منفی سطر لولا و انتخاب کوچکترین قدر مطلق عدد حاصله بدست می آید. ستون حاصله را ستون لولا می نامیم. بطور خلاصه داریم:

$$\theta = \text{Min} \left\{ \left| \frac{C_j}{a_{ij}} \right| ; a_{ij} < 0 \right\} \quad (\text{متغیر ورودی})$$

که در آن C_j اعداد سطر صفر و a_{ij} عناصر سطر لولا می باشد.

نکته: اگر تمام عناصر سطر لولا غیر منفی باشد، در اینصورت مسئله فاقد منطقه موجه بوده و جواب ندارد. در اینصورت مسئله اولیه دارای جواب نامحدود می باشد.

نکته: اگر شرایط مساوی جهت انتخاب متغیر ورودی داشته باشیم مسئله دارای جواب چندگانه می باشد. در این حالت مسئله اولیه دارای جواب منحنی می باشد.

نکته: در سیمپلکس ثانویه هدف از آزمون نسبت، حفظ شرط بهینگی در جدول بعدی می باشد.

۹-۴- مقایسه روش سیمپلکس معمولی و سیمپلکس ثانویه

سیمپلکس معمولی	سیمپلکس ثانویه
تابع هدف بصورت Max	تابع هدف بصورت Max
محدودیتها بصورت \leq	محدودیتها بصورت \leq
$RHS > 0$	$C_j > 0$
ابتدا متغیر ورودی (ستون لولا)	ابتدا متغیر خروجی (سطر لولا)
منفی ترین ضریب سطر صفر	منفی ترین ضریب در RHS
خارج قسمت RHS به ستون مثبت لولا	خارج قسمت ضرایب سطر صفر به سطر منفی لولا
حداقل نسبت	حداقل قدر مطلق نسبت
عدد لولا همیشه بزرگتر از صفر	عدد لولا همیشه کوچکتر از صفر
اگر تمام عناصر ستون لولا غیر مثبت باشد	اگر همه عناصر سطر لولا غیر منفی باشد
مسئله نامحدود می باشد	مسئله غیر قابل قبول است.

۱۰-۴- نوع خاص سیمپلکس ثانویه (محدودیت مصنوعی)

اگر چنانچه در جدول سیمپلکس ثانویه شرط بهینگی نقض شده باشد (یعنی در سطر صفر جدول پس از استاندارد نمودن مسئله و تبدیل به Max مقدار منفی وجود داشته باشد)، در این حالت از محدودیت مصنوعی استفاده می کنیم.

۱۰-۴-۱- تعریف محدودیت مصنوعی

برای حل هر مسئله از طریق روش سیمپلکس ثانویه که شرایط بهینگی را ندارد (وجود مقدار منفی در سطر تابع هدف) از محدودیت $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n \leq M$ که در آن x_i ها متغیرهای غیر پایه ای می باشند استفاده می شود. به محدودیت فوق محدودیت مصنوعی گفته می شود و داریم:

$$x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_n = M$$

که در آن x_0 متغیر کمکی می باشد.

۱۰-۴-۲- الگوریتم حل

۱- مسئله را به حالت استاندارد تبدیل می کنیم (تابع هدف Max و محدودیتها \leq (ک.م.))

۲- در صورتی که مسئله شرایط بهینگی را نداشته باشد محدودیت مصنوعی مناسب را به مسئله و جدول اضافه می کنیم.

۳- متغیر واجد شرایط ورود به پایه را انتخاب نموده و سپس متغیر x را بدون هیچ گونه شرطی از پایه خارج می کنیم که در این حالت شرایط بهینگی حاصل می شود.

۴- بقیه مراحل مثل روشهای قبل حل می شود.

۴-۱۱- قضیه فارکاس

دو مسئله روبرو را در نظر بگیرید. اگر A یک ماتریس $m \times n$ و b یک ماتریس $m \times 1$ باشد آنگاه ثابت کنید که:

الف - اگر مدل (I) جواب شدنی داشته باشد مدل (II) جواب ندارد.

ب - اگر مدل (I) جواب نداشته باشد مدل (II) حتماً جواب دارد.

$$\begin{array}{ll} (I) & (II) \\ Ax = b & Ay \geq 0 \\ x \geq 0 & by < 0 \end{array}$$

در شکل تغییر یافته قضیه فارکاس نیز فقط و فقط یکی از دو سیستم زیر جواب خواهد داشت.

$$\begin{array}{ll} (I) & (II) \\ Ax \leq b & Ay \leq 0 \\ x \geq 0 & y \leq 0, by > 0 \end{array}$$

۴-۱۲- مسائل معادل در برنامه ریزی خطی

مسئله برنامه ریزی خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\{Max Z = Cx \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

محدودیتهای این مسئله همگی بصورت تساوی بوده و یا اینکه بصورت تساوی درآمده اند. در اینصورت همواره روابط زیر برقرار خواهد بود.

۱- اگر محدودیتی در عدد 0 ضرب شود در اینصورت جوابهای مسئله اولیه تغییر نمی کند و متغیر متناظر آن محدودیت در مسئله ثانویه در $\frac{1}{\lambda}$ ضرب می شود و در هر دو مسئله مقدار تابع هدف تغییر نمی کند.

۲- اگر بردار ستونی یکی از متغیرها در عدد 0 ضرب شود، آنگاه متغیر مربوطه در $\frac{1}{\lambda}$ ضرب

می شود ولی جوابهای مسئله ثانویه تغییری نمی کند و تابع هدف در هر دو مسئله بدون تغییر باقی خواهد ماند.

۳- اگر k برابر یک سطر به سطر دیگر اضافه شود، جوابهای بهینه مسئله اولیه و ثانویه هیچ تغییری نخواهد کرد.

۴- اگر k برابر یک ستون به ستون دیگر اضافه شود، جوابهای بهینه مسئله اولیه و ثانویه هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵- اگر k برابر یک سطر به تابع هدف افزوده شود، جوابهای مسئله اولیه تغییری نخواهد کرد ولی جوابهای مسئله ثانویه بعلاوه k برابر خواهد شد و مقدار تابع هدف هر دو مسئله به اندازه ky_i تغییر می نماید.

۶- اگر k برابر یک ستون به سمت راست اضافه شوند جوابهای بهینه مسئله اولیه بعلاوه k برابر شده ولی جوابهای ثانویه تغییری نخواهد کرد و مقدار تابع هدف هر دو مسئله به اندازه ky_i تغییر می نماید.

۷- هرگاه مقادیر سمت راست در ≤ 0 ضرب شود، مقادیر متغیرهای مسئله اولیه ≤ 0 برابر شده و متغیرهای مسئله ثانویه تغییری نمی کند و مقدار تابع هدف در هر دو مسئله ≤ 0 برابر می شود.

۸- هرگاه سطر هدف مسئله ای در عدد ≤ 0 ضرب شود، جوابهای مسئله اولیه تغییری نکرده ولی جوابهای ثانویه در ≤ 0 ضرب می شود و مقدار هر دو تابع هدف ≤ 0 برابر می شود.

۹- اگر مقادیر سطر هدف در عدد α و سمت راست در عدد β ضرب شوند، مقادیر متغیرهای مسئله اولیه در β و مقادیر متغیرهای مسئله ثانویه در α ضرب می شوند و مقدار تابع هدف در هر دو مسئله در $\alpha\beta$ ضرب می شود.

سمت راست $(\alpha, \beta) > 0$ تابع هدف

۱۰- هریک از حالات فوق در صورتی که با هم ترکیب شوند، نتایج حاصله نیز با هم ترکیب خواهند شد.

۱۱- هرگاه همه مقادیر سمت راست مسئله ای بعلاوه k شود در اینصورت جواب مسئله تغییر یافته ثانویه، نسبت به مسئله اولیه دارای حالت زیر می باشد:

$$Z_{\text{جدید}} = Z_{\text{قدیم}} + \sum_{i=1}^k k_i y_i$$

$$Z = (b_i + k_i) y_i$$

هر دو بهینه هستند

حال اگر مقدار تابع هدف مسئله اولیه، بهینه بوده و تغییر یافته بهینه نباشد، رابطه به شکل زیر است:

$$Z_{\text{جدید}} \leq Z_{\text{قدیم}} + \sum_{i=1}^k k_i y_i$$

و اگر تابع هدف مسئله اولیه بهینه نبوده و تغییر یافته آن، بهینه باشد رابطه بصورت \geq ظاهر می شود و در صورتی که هر دو بهینه باشد رابطه به شکل تساوی در می آید و بطور کلی مقدار تغییرات تابع هدف برابر رابطه زیر است:

$$\Delta Z = \sum_{i=1}^k k_i y_i \quad \text{یا} \quad \Delta Z = y_i^* \cdot \Delta b_i$$

نکته: اگر بخواهیم از چندین منبع موجود یک منبع انتخاب کنیم تا مقدار آن را افزایش دهیم، محدودیتی (منبعی) انتخاب می شود که باعث بهینه نمودن مقدار تابع هدف گردد و در حالت Max داریم:

$$\Delta Z = Max [y_i^* \cdot \Delta b_i] \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n$$

سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج) صلوات

